

Wypadek

A night-time photograph of an emergency scene. A red fire truck with blue and red flashing lights is parked on the right side of the road. The number '30240' is visible on the side of the truck. In the background, a dark-colored car with its headlights on is visible. Several people are standing on the left side of the road, near a street lamp. The scene is illuminated by the street lamps and the emergency lights of the vehicles.

Marta Kwiaton

Łańcuch przeżycia



Wypadek komunikacyjny



Ocena miejsca zdarzenia

- Bezpieczeństwo własne
- Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
- Wstępna segregacja poszkodowanych
- Niezbędny sprzęt
- Mechanizm urazu

Gaśnica samochodowa

- Prawidłowe użycie gaśnicy samochodowej (najczęstsza i najtańsza to proszkowa BC, odbezpieczenie, syfon, 1kg = 6 sekund gaszenia)





Mechanizm urazu

- **Oglądanie miejsca wypadku:**
- Zniekształcenia wewnętrzne i zewnętrzne pojazdu
- Którymi częściami ciała poszkodowany uderzył w części pojazdu?
- Trzy zderzenia

Zderzenie ...

- **Czołowe** – obrażenia od przedniej szyby, kierownicy, deski rozdzielczej i pasów, wypadnięcie przez przednią szybę
- **Boczne** – obrażenia wewnętrzne, urazy miednicy, kończyn dolnych, kręgosłupa
- **Uderzenie w tył** – obrażenia kręgosłupa szyjnego
- **Dachowanie** – obrażenia wewnętrzne, zwłaszcza u pasażerów nie przypiętych pasami bezpieczeństwa
- **Potrącenie pieszego** – obrażenia pierwotne i wtórne

Wskazania do ewakuacji poszkodowanego z pojazdu

- Niemożność udrożnienia dróg oddechowych w pozycji zastanej
- Konieczność podjęcia RKO
- Miejsce niebezpieczne dla poszkodowanego – uważając na własne bezpieczeństwo!






Ocena wstępna poszkodowanego

- Ogólne wrażenie
- Stan świadomości
- ABC

Airways

- Uwaga na uszkodzenie kręgosłupa szyjnego



Zapewnić drożność dróg oddechowych
(wysunięcie żuchwy, rurka ustno-gardłowa,
Intubacja)

Tlenoterapia



Breath



Osłuchać oba płuca i
okolice żołądka

Odma prężna?

Ocena klatki piersiowej

Kontrola oddechu co 1 minutę

Circulation

- **Jeśli oddycha**, oceń obecność i charakter tętna.
- Tętno utrzymuje się przy ciśnieniu krwi:
 - ≥ 60 mm Hg na tętnicy szyjnej
 - ≥ 70 mm Hg na tętnicy udowej
 - ≥ 80 mm Hg na tętnicy promieniowej
- Zatamaj krwotoki
- Dostęp dożylny

Disability, Exposure

- D - zaburzenia czynnościoun
- E – oglądanie ciała



Kołnierz ortopedyczny











Szybkie badanie urazowe

- Głowa
- Szyja
- Klatka piersiowa
- Brzuch
- Miednica
- Kończyny dolne i górne

Wstrząs

- Wstrząs występuje gdy ilość dostarczanego tkankom tlenu nie wystarcza do podtrzymania funkcji życiowych narządów.
- Objawy i postępowanie



Jeśli nie oddycha rozpocznij RKO





Podsumowanie

- Podstawowe czynności resuscytacyjne prawie nie różnią się od podstawowych zabiegów resuscytacyjnych w innych sytuacjach
- Nacisk na ocenę miejsca zdarzenia i stabilizację kręgosłupa szyjnego
- Wstrząs